

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Sent: Tue, 27 May 2025 09:17:35 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>
Subject: RE: gasvormig N-verlies biologisch gehouden melkgeiten

Hoi 5.1.2.e

In de landbouwtelling van 2010 is eenmalig gevraagd naar de weidegang van melkgeiten. Biologische bedrijven pasten toen gemiddeld 20 weken weidegang toe bij melkgeiten van 1 jaar en ouder. Over het aantal uur is niets bekend. Bij 6 uur per dag is dit $20 \times 7 \times 6 \text{ uur} = 840 \text{ uur}$. Ik heb een variant voor dit aantal uur toegevoegd. Straks stuur ik de nieuwe resultaten.

Weidegang van melkgeiten in 2010

		Bedrijven	melkgeiten ≥ 1 jr Dieren	weideweken.geiten gemiddeld
skalerkenning	gangbaar bedrijf	502	201567	7
	biologisch bedrijf	62	20448	20
	Total	564	222015	8

Inclusief kleine bedrijven onder de SO-grens

Groet, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@wur.nl>
Verzonden: maandag 26 mei 2025 16:37
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@cbs.nl>
Onderwerp: gasvormig N-verlies biologisch gehouden melkgeiten

[Externe email]

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

De Skal-eisen voor weidegang van biologisch gehouden geiten zijn niet duidelijk. Zie onder een samenvatting 5.1.2.e die met ons dat geitenproject heeft uitgevoerd.

Kort door de bocht: Gedurende het hele weideseizoen moeten de dieren toegang tot de weide hebben. Of ze er ook komen wordt niet gevraagd. Onderbouwd inschatten van het effect op de gasvormige N-verliezen is daardoor niet mogelijk. Wat denken jullie, zullen we dat zo opschrijven in het actualisatierapport en geen onderscheid maken in N-verlies bij gangbaar en biologisch? Of toch maar wat inrekenen?

Groeten,

5.1.2.e

Op de website van SKAL zie ik: *De dieren kunnen altijd naar buiten, tenzij dit wordt verhinderd door weers-, bodem- en gezondheidsomstandigheden*. Die had je zelf denk ik ook al gevonden, maar het lijkt erop dat dit de richtlijn is; daar moeten biologische geitenhouders (en geiten) het mee doen.

Zie ook de bijgevoegde notitie (alleen de Mangementsamenvatting lezen is voldoende) van de GD uit 2020. Die lijkt geschreven te zijn juist omdat SKAL hier zoveel ruimte laat.

Ik heb mij de afgelopen jaren nooit echt specifiek in de biologische geitenhouderij verdiept, dus mijn beeld zal niet compleet zijn. Op basis van mijn beperkte blik zou ik zeggen:

- Geiten weiden is echt anders dan koeien weiden. Geiten gaan minder graag naar buiten, zijn daar veel kieskeuriger in. Het is ook lastiger om ze via weidegang een groot deel van het rantsoen te laten eten. Geit is een browser; eet wel gras, maar niet in bulk.

- Geitenhouders gaan verschillend om met weidegang: sommigen doen niet veel meer dan een deurtje openzetten, zodat geiten naar buiten kunnen. Anderen brengen de geiten actief naar buiten, bijvoorbeeld elke ochtend na het melken. Ook bij het enkel openzetten van een deurtje is het erg afhankelijk van hoeveel hier gebruik van wordt gemaakt: hoe groot is de opening en waar bevindt die zich in de stal, zijn geiten dan direct in de wei of moeten ze eerst nog een pad aflopen; wat voor faciliteiten zijn er buiten aan watervoorziening, klautermogelijkheden, schuilmogelijkheden; ...?
- Mijn inschatting is dat als je de vereisten van de melkveehouderij toe zou passen op de geitenhouderij, dus 720 uur weidegang per jaar, diverse biologische geitenhouders dit niet halen. Maar aan cijfers op percentages ga ik me verder niet wagen.