

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Sent: Tue, 18 Feb 2025 15:11:09 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@cbs.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@wur.nl>
Subject: kleine categorieën
Attachments: vergelijk herten en buffels Tabel 4 vs onderliggend rapprt 2005.docx

[Externe email]

Hallo 5.1.2.e

Ik was nog even aan het kijken naar de excreties van waterbuffels en herten. Tabel 4, Bikker et al. 2019 en Groenestein et al 2015 komt hierbij overeen. Echter, deze zijn gebaseerd op de getallen van KEmme et al 2005, en deze laat heel andere getallen zien.

Zie bijlage.

De excreties in 2005 zijn over het algemeen hoger dan die in Tabel 4. Is er iets veranderd aan de samenstelling van de rantsoenen? Het kan niet zitten in het verschil netto/bruto, lijkt me (aangezien 2005 hoger ligt).

5.1.2.e weet jij hier misschien nog iets van?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e PhD
Researcher Roughage, Grass and Grazing

Wageningen Livestock Research
Afdeling Diervoeding

P.O Box 338, 6700 AH Wageningen

De Elst 1, 6708 WD Wageningen

M 5.1.2.e
E 5.1.2.e@wur.nl

www.wur.nl/en/livestock-research

[disclaimer](#)